«АЛЕСОРБ 3+» — это биологически активная добавка (БАД) в форме порошка для приготовления суспензии, предназначенная для выведения из организма токсинов.
Она не является лекарственным средством.

Состав и форма выпуска
В состав входят **диоксид кремния** (коллоидный, аморфный) и **микрокристаллическая целлюлоза (МКЦ)**. Препарат не содержит красителей, ГМО и сахара.
Выпускается в банках по 25 г и 50 г, а также в саше-пакетах по 2 г.

Как работает
В просвете желудочно-кишечного тракта «Алесорб 3+» связывает и выводит из организма различные токсические вещества: патогенные бактерии и их токсины, аллергены, лекарственные препараты, соли тяжёлых металлов, радионуклиды и алкоголь. Обладает выраженными сорбционными и детоксикационными свойствами.

Показания к применению
Рекомендуется в качестве источника нерастворимых пищевых волокон. Также применяется при:
- острых и хронических интоксикациях различного происхождения;
- острых кишечных инфекциях;
- пищевых токсикоинфекциях;
- аллергических заболеваниях (в комплексной терапии);
- эндогенных и экзогенных токсикозах;
- острой и хронической почечной недостаточности (в комплексной терапии);
- заболеваниях печени с явлениями гипербилирубинемии;
- для профилактики хронических интоксикаций у работников вредных производств.

Способ применения и дозы
Принимают внутрь **только в виде водной суспензии**. Для её приготовления необходимое количество порошка размешивают в половине стакана воды (100 мл). Перед использованием банку с плотно закрытой крышкой следует встряхнуть.

Дозировка зависит от возраста:
- **Дети 3–7 лет:** по 1–2 г (примерно половина чайной ложки «с горкой») 2 раза в день.
- **Дети 7–14 лет:** по 2–4 г (примерно одна столовая ложка «с горкой») 3 раза в день.
- **Дети с 14 лет и взрослые:** по 4–6 г (две столовые ложки «с горкой») 3 раза в день.

Принимают за 1 час до еды и приёма других лекарственных средств.
Продолжительность приёма — 7–10 дней.

Противопоказания
- индивидуальная непереносимость компонентов продукта;
- язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки в стадии обострения;
- кровотечения из желудочно-кишечного тракта;
- атония кишечника.

Важные предупреждения
- Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом, а перед применением у детей — с педиатром.
- При длительном приёме возможно развитие гиповитаминоза, поэтому рекомендуется дополнительный приём витаминов.
- Препарат снижает всасывание других лекарственных средств, поэтому их нужно принимать с интервалом 1–2 часа.

- При беременности и грудном вскармливании применение возможно только если предполагаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода или ребёнка, обязательна консультация врача.

Условия хранения
Хранить в сухом, недоступном для детей месте при температуре не выше 25 °С. Срок годности — 5 лет